Condensations parenchymateuses pulmonaires

- Définition
- Diagnostic différentiel
- Diagnostic positif
- Etiologies

- **Kyste aérien** = espace parenchymateux bien limité par un épithélium
 - ou une paroi fibreuse d'épaisseur variable < 2 mm.
 - Parenchyme adjacent sain.
- **Cavité aérique** = Espace aérien au sein d'une condensation pulmonaire.
- **Nombreux.**

**Kystes
pulmonaires
multiples**

**Diagnostic différentiel des kystes
pulmonaires**
(≠ Paroi tapissée épithélium, < 2mm)

Artère centro-lobulaire

Emphysème

Pneumatocèle
post-traumatique

Cavité post-infectieuse

Cavité nécrotique

Dilatations des bronches

Rayon de miel

- Moyens de diagnostic par approche multidisciplinaire :
 - signes et symptômes cliniques thoraciques,
 - signes et symptômes extra-thoraciques,
 - ± biologie.
- Evolution sur les symptômes, leur durée et des aspects radiologiques.

- Tomodensitométrie (TDM) en haute résolution : **Fondamentale.**
- Elle permet :
 - la visualisation
 - la reconnaissance
 - la compréhension du développement
 - le suivi des kystes pulmonaires multiples notamment chez les patients asymptomatiques.

Principales étiologies des kystes pulmonaires multiples

- Histiocytose Langheransienne (HL)
- Lymphangiomyomatose et Sclérose Tubéreuse de Bourneville
- Pneumonie Interstitielle Lymphoïde (PIL)
- Mutation du gène de la folliculine (Birt - Hogg - Dubé)
- Vieillesse pulmonaire
- Amyloïdose pulmonaire
- Maladie par dépôt des chaînes légères
- Pneumopathie d'hypersensibilité
- Métastases kystiques
- Malformation adénomatoïde kystique (chez l'enfant)

- Maladie de l'adulte jeune, tabagique
mais possible chez l'enfant et l'adulte d'âge mûr.
- Présentation polymorphe :
 - asymptomatique (1/4 des cas)
 - toux sèche, dyspnée
 - douleur thoracique par pneumothorax, parfois révélateur
 - asthénie, diabète insipide, douleur osseuse.

- Infiltration péribronchiolaire par cellules de Langherans :
Formation de granulomes (nodules stellaires).

- Cavitation : nodule troué.

- Kyste pulmonaire.

- Coalescence de kystes : poumon en « dentelle ».

- Nombreux et de taille variable, de forme ronde ou ovale.
- Parfois associés à des nodules.
- Épargnant les récessus cardio-phréniques.

- Nombreux et de taille variable.
- Ici, pneumothorax gauche.

Kystes pulmonaires multiples

Kystes de l'Histiocytose Langheransienne

- Nombreux et de taille variable (souvent < 10mm et parfois > 20 mm) de forme ronde ou ovale.
- Parfois associés à des nodules.
- Épargnent les récessus cardio-phréniques.

- Coalescence de kystes après plusieurs années d'évolution, émaillée de pneumothorax récidivants, traités spécifiquement.

- Coalescence de kystes : Aspect « en dentelle »

- Maladie rare, de la femme en âge de procréer, mais possible chez l'homme.
- Présentation non spécifique :
 - Dyspnée, toux
 - Pneumothorax récidivant
 - Chylothorax, ascite chyleuse.
- Forme associée à la sclérose tubéreuse de Bourneville :
 - présentation non spécifique
 - ou autres manifestations de la sclérose tubéreuse
 - (tumeurs rénales, anomalies cardiaques, syndrome neurocutané).
- Forme sporadique (5 à 10 fois moins fréquente) :
 - Présentation non spécifique surtout thoracique.

- **Hypothèse 1 :**

Obstruction autour des bronchioles terminales, des parois alvéolaires, des vaisseaux pulmonaires, des lymphatiques par des amas de cellules musculaires lisses (cellules LAM).

Trappage aérien

Kystes

Obstruction lymphatique

Chylothorax, épanchement péricardique

- **Hypothèse 2 :**

Dégradation métabolique de l'interstitium par des métalloprotéinases produites par les cellules LAM.

**Kystes
pulmonaires
multiples**

Kystes de LAM

Nombreux bien limités,
diffus de 2 à 5 mm,
sans prédominance lobaire.

Poumon adjacent normal.

Nombreux bien limités,
diffus de 2 à 5 mm,
sans prédominance lobaire.

Poumon adjacent normal.

Ici associés à un lymphangiome rétropéritonéal (flèche)
de sclérose tubéreuse.

**Kystes
pulmonaires
multiples**

Kystes de Lymphangioliéiomyomatose (LAM)

Nombreux bien limités, sans répartition préférentielle
2 à 5 mm, jusqu'à 30 mm.

Peuvent grossir et confluer jusqu'à ressembler
à un emphysème panlobulaire.

- **Affection lymphoproliférative bénigne :**

Souvent associée à des pathologies sous jacentes :

- syndrome de Gougerot-Sjögren, connectivites, infection au virus d'immunodéficience humaine (VIH),
- thyroïdite auto-immune, maladie de Castelman,
- lupus érythémateux systémique.

Peut aussi être isolée.

- **Présentation clinique non spécifique :**

- Toux
- Dyspnée
- Pneumothorax récidivant
- Fièvre
- Altération de l'état général.

- **Infiltrat inflammatoire diffus**
(lymphocytes, cellules plasmatiques, ±histiocytes)
à proximité des canaux lymphatiques,
dans les 3 compartiments du secteur interstitiel
(péri-bronchiolaire, paraseptal, sous pleural).
- **Infiltrat péribronchiolaire**

Sténose ou occlusion bronchiolaire

Trappage aérien

Dilatation des bronchioles distales.

Kystes pulmonaires multiples

Kystes de Pneumonie interstitielle lymphoïde

Ici syndrome de Gougerot-Sjögren

- **Kystes épars,**
 - < 3 cm sur les deux champs pulmonaires
 - verre dépoli
 - nodules centro-lobulaires
 - nodules sous pleuraux
 - épaissement septal interlobulaire.
- Evolution non prévisible des kystes sous traitement.

- **Kystes peu nombreux**
< 3 cm répartis sur les deux champs pulmonaires.
- **Présents** chez
≈ 80% des patients.
- **En association fréquente**
avec :
 - verre dépoli
 - nodules centro-lobulaires
 - nodules sous-pleuraux
 - épaissement septal interlobulaire.

- Chez des patients d'âge moyen, $\frac{3}{4}$ des patients ont une pathologie sous-jacente : myélome multiple, maladie de Waldenström, lymphome B.
- Atteinte multi-systémique préférentielle : reins, cœur, foie. Atteinte pulmonaire moins fréquente, pouvant se traduire par une détresse respiratoire.
- Pas de fixation au rouge Congo, car pas de matériel amyloïde dans ce dépôt de chaînes légères (diagnostic différentiel).
- Les chaînes légères sécrétées par un clone plasmatique se déposent dans les parois alvéolaires, les petites voies aériennes et les vaisseaux.

- **Survenue à 30-40 ans** (20-85 ans)
sans prédominance masculine ou féminine.
- **Désordre multi-systémique** prédominant sur
la peau (fibrofolliculomes), le poumon, le rein.
- **Découverte :**
 - Asymptomatique
 - Papules de fibrofolliculomes cutanés
 - Kystes rénaux
 - Tumeurs rénales malignes
(50,7 ans en moyenne)
avec ou sans pathologie cutanée.

- Syndrome lié à une mutation du gène codant la folliculine : 17p11.2
 - Pathologie génétique par défaut de codage de la folliculine.
-
- Développement mésodermique anormal.
 - Pas de prolifération néoplasique, pas d'inflammation.
 - Pas de fibrose, pas d'atypie.
 - Expression normale de la protéine codeuse dans stroma pneumocytes I, peau, reins.

- Kystes « classiques »
- Ou pouvant contenir des septa (paroi alvéolaire).
- Pneumothorax.

- Infection fongique presque exclusivement chez les patients immunosupprimés **avec un taux de CD4 < 200- μ l**. Réduction drastique avec thérapie anti-rétro-virale du VIH.
- Signes d'appel non spécifiques :
 - Toux
 - Fébricule
 - Dyspnée
 - Pneumothorax spontané.
- Progression insidieuse ou fulminante des symptômes jusqu'à une détresse respiratoire.
- Kystes au sein de zones en verre dépoli.

- 25% > 75 ans, pas avant 50 ans.
- De découverte fortuite, asymptomatique.
- Sans corrélation avec l'emphysème ou le tabagisme.
- Pas de corrélation avec les EFR, sauf la diffusion libre du monoxyde de carbone (DLCO) qui est abaissée.
- Indice de masse corporelle (BMI) < 25 kg/m².

**Kystes
pulmonaires
multiples**

Kystes du vieillissement pulmonaire

Peu nombreux.
Situés dans les lobes inférieurs.
Taille < 3 cm.

- Diagnostic sur des critères Cliniques et Radiologiques.
- Exposition aux allergènes
 - poumon des éleveurs d'oiseaux
 - poumon de fermier.
- Verre dépoli avec aspect en mosaïque et trappage expiratoire.
- Valeur en dehors des phases aiguës de la présence de kystes isolés.

Bronchiolite cellulaire

Obstruction des petites voies
aériennes

Dilatation « kystique »
des bronchioles terminales.

Kystes pulmonaires multiples

Kystes de pneumopathie d'hypersensibilité

- Peu nombreux
- En phase aiguë
- Associés au verre dépoli
- Mosaïque
- Trappage
- Peuvent être isolés en dehors de la phase aiguë

- **Rares.**
- **Rapportées dans**
 - Métastases de tumeur pancréatique
 - Métastases de cancer colique
 - Métastases de sarcomes
(angiosarcome du cuir chevelu, sarcome utérin)
 - Métastases ORL.
- **Rapportées**
 - avant ou après chimiothérapie.

*Métastases
Tumeur
pancréatique*

Enfant

- Malformation adénomatoïde kystique.
- *Forme kystique de séquestration pulmonaire, très rare.*

- **Malformation congénitale :**
 - arrêt localisé du développement d'un bourgeon bronchique
 - découvert en échographie anténatale
 - ou sur une décompensation respiratoire
 - ou infections à répétition.
- **Toujours rechercher une séquestration pulmonaire associée.**

**Kystes
pulmonaires
multiples**

**Kystes de Malformation adénomatoïde
kystique**
Classification de Stocker

Type I :
Petit nombre de
grands kystes
(alvéoles ~ normaux).

Type II :
Petits kystes (<1 cm)
Très nombreux
(alvéoles larges).

Type III :
Masse non kystique
de grande taille
(structures régulières).

Ici type I de Stocker.

- Mode de révélation clinique varié et non spécifique pneumothorax fréquent dans :
 - Histiocytose Langheransienne
 - LAM
 - Birt – Hogg – Dubé.
- Maladies génétiques :
 - Sclérose tubéreuse de Bourneville
 - Birt – Hogg – Dubé.

- Cohabitation avec les maladies de système :
 - Histiocytose Langheransienne
 - Pneumonie interstitielle lymphoïde
 - Amyloïdose
 - Maladie avec dépôt de chaînes légères.
- Pneumopathie d'hypersensibilité :
 - Avec infection sous immunodépression sévère
 - Vieillesse pulmonaire.
- Enfant :
 - Malformation adénomatoïde kystique pulmonaire.

Contrôler le rein

devant toute maladie kystique pulmonaire.

Maladie kystique pulmonaire et lésion rénale

- Lymphangiomeiomyomatose
- Sclérose tubéreuse de Bourneville
- Métastases kystisées d'une néoplasie rénale
- Syndrome de Birt - Hogg - Dubé
- Syndrome de Protée.

F.A. Ferreira Francisco, A.S. Soares Souza, G. Zanetti, E. Marchiori.
Multiple cystic lung disease.
Eur Respir. Rev. 2015;24:552-64.

D.M. Seaman, C.A. Meyer, M.D. Gilman, F.X. McCormack.
Cystic lung disease at High-Resolution CT.
AJR 2011;196:1305-1311.

Contributeurs au programme : **Imagerie de la Pathologie Infiltrative Pulmonaire**

www.clubthorax.com

Les auteurs, membres du Club Thorax

Sébastien BOMMARD, Marie-Pierre DEBRAY, Gérard DURAND, Mostafa EL HAJJAM,
Pierre FAJADET, Benoit GHAYE, Jacques GIRON, Antoine KHALIL,
Alexis LACOUT, Pierre-Yves MARCY, Liliane METGE, Grégoire PRÉVOT.

ASSOCIATION « CLUB THORAX » - Service de Radiologie – Hôpital Ambroise Paré
9, avenue Charles de Gaulle - 92100 Boulogne-Billancourt

Réalisé avec le soutien de Roche

Réalisation